



Richtlijnen voor de patiënt

Voor de ingreep:

- Voor de ingreep is het 10 dagen lang verboden om aspirine of ontstekingsremmers in te nemen.
 - Het is aangeraden om tijdens de 3 dagen voor de ingreep 3 x 2 tabletten per dag “Traumeel” in te nemen, om onderhuidse bloeduitstortingen te verminderen. “Traumeel” moet op een nuchtere maag worden ingenomen.
 - Het is aangeraden om “Nutrimonium” voedingssupplementen te gebruiken tijdens de maand voor de ingreep.
 - Op de dag van de ingreep is het aangeraden om geen make-up of nagellak te dragen en geen dagcrème te gebruiken.

Lipcorrectie

- Op de dag van de ingreep is het aangeraden om geen contactlenzen te dragen.
- Op de dag van de ingreep is het aangeraden om geen juwelen te dragen.
- Op de ochtend van de ingreep moet het haar worden gewassen met antiseptische zeep type Hibiscrub, Uni-Cura of Betadermyl (verkrijgbaar bij de apotheek).

Na de ingreep:

- Na de ingreep is het 24 uur lang verboden een auto te besturen.
 - De pleister die net na de ingreep wordt aangebracht mag de volgende dag reeds worden verwijderd.
 - Tijdens de 5 dagen na de ingreep is het aangeraden 3 x 2 tabletten per dag "Traumeel" in te nemen, om onderhuidse bloeditstoringen te verminderen.
 - Als u pijn voelt is het aangeraden om Dafalgan (paracetamol) in te nemen a rato van 1 tablet van 1g, 4 maal per dag, afwisselend met Ibuprofen 600 mg of 400 mg, 2 maal per dag. Als de pijn hevig wordt kunnen andere pijnstillers worden voorgeschreven.
 - U krijgt antibiotica voorgeschreven die 2x/dag ingenomen moeten worden.
 - Om het oedeem en de bloeditstoringen te verminderen moeten koude kompressen worden aangebracht op de mond, waarbij rechtstreeks contact tussen de huid en het ijs vermeden moet worden.
 - Het is aangeraden om "Nutrionium" voedings-supplementen te gebruiken tijdens de maand na de ingreep, om het genezingsproces te versnellen.
 - Na de ingreep is het aangeraden om 4 weken lang niet te sporten.

VRAAG?

webinfo@beclinic.com

+32 2 309 6000