



Richtlijnen voor de patiënt

Voor de ingreep:

- Voor de ingreep is het 10 dagen lang verboden om aspirine of ontstekingsremmers in te nemen.
 - Het is aangeraden om tijdens de 3 dagen voor de ingreep 3 x 2 tabletten per dag “Traumeel” in te nemen, om onderhuidse bloedingen te verminderen. “Traumeel” moet op een nuchtere maag worden ingenomen.
 - Op de dag van de ingreep is het aangeraden om geen make-up te dragen en geen dagcrème te gebruiken.
 - Op de dag van de ingreep is het aangeraden om geen contactlenzen te dragen.

Temporaallift of wenkbrauwlift

- Op de dag van de ingreep is het aangeraden om geen juwelen te dragen.
- Op de ochtend van de ingreep moet het haar worden gewassen met antiseptische zeep type Hibiscrub, Uni-Cura of Betadermyl (verkrijgbaar bij de apotheek).
- Vanaf 6 uur voor de ingreep is het verboden alcohol te drinken of te roken, en is het aangeraden zeer weinig te eten.

Na de ingreep:

- Na de ingreep is het 24 uur lang verboden een auto te besturen.
- Tijdens de 5 dagen na de ingreep is het aangeraden 3 x 2 tabletten per dag "Traumeel" in te nemen, om onderhuidse bloedingstoringen te verminderen.
- Als u pijn voelt is het aangeraden om Dafalgan (paracetamol) in te nemen a rato van 1 tablet van 1g, 4 maal per dag, afwisselend met Ibuprofen 600 mg of 400 mg, 2 maal per dag. Als de pijn hevig wordt kunnen andere pijnstillers worden voorgeschreven.

Indien u antibiotica worden voorgeschreven moeten deze 2x per dag worden ingenomen.

- Na de ingreep verschijnt er een oedeem, dat na enkele dagen spontaan weer verdwijnt. Blauwe plekken blijven ongeveer twee weken zichtbaar.
- Om het oedeem en de bloedingstoringen te verminderen is het aangeraden om 3 dagen lang met het hoofd lichtjes hoger op twee hoofdkussens te slapen.
- Vanaf de 3^e dag na de ingreep mag het haar gewassen worden.
- Na de ingreep is het aangeraden om 4 weken lang geen zware voorwerpen te dragen en niet te sporten.

VRAAG?

webinfo@beclinic.com

+32 2 309 6000